



# Dr. MICAMES

Gastroenterología

## Instrucciones para el Tratamiento de la Bacteria *Helicobacter pylori* (H. pylori)

Durante el procedimiento de la gastroscopía a usted se le tomó una biopsia del estómago. Si se le entregó esta hoja es porque se le detectó la bacteria *Helicobacter pylori* y requiere tratamiento para eliminarla. Es importante tomar todos los medicamentos hasta completarlos. De tener algún efecto adverso durante el tratamiento favor de comunicarse a nuestra oficina.

- 1.** El tratamiento usualmente consiste de tres medicamentos, uno para bloquear la producción de ácido del estómago (conocido como inhibidor de la bomba de protones) y dos antibióticos, por un periodo de 10 a 14 días.
- 2.** El medicamento para bloquear la producción de ácido se debe tomar en ayuna, o sea antes del desayuno y antes de la cena.
- 3.** Los dos antibióticos que usualmente se recetan son amoxicilina (nombre comercial Amoxil) y claritromicina (nombre comercial Biaxin). De usted ser alérgico a la penicilina o los macrólidos, no puede tomar esta combinación de medicamentos y favor de notificarlo llamando a nuestra oficina
- 4.** Los antibióticos deben tomarse después del desayuno y de la cena, o sea con el estómago lleno.
- 5.** Al terminar el tratamiento, suspende los medicamentos recetados para el estómago.
- 6.** Luego de cuatro semanas de haber completado el tratamiento, se va a hacer una prueba en el laboratorio donde determinan si eliminó la bacteria. Esta prueba se llama *H. pylori stool antigen* y requiere de una muestra de excreta. El envase para la muestra será proveída por el laboratorio.
- 7.** Al obtener el resultado, favor de llevar a nuestra oficina para discutirlos.